


CYPERFOR S



Lutte contre les pucerons en Espaces verts et pépinières



INSECTICIDE

- Pucerons des arbres et arbustes d'ornement
- Pucerons des Rosiers

SITE INTERNET : www.dow-ev.com

CYPERFOR S



COMPOSITION

CYPERFOR* S est un insecticide sous forme de concentré émulsionnable contenant 100 g/l de cyperméthrine.

MODE D'ACTION

CYPERFOR S agit par contact et ingestion à des doses très faibles. La cyperméthrine agit quel que soit le stade de l'insecte, adulte ou larve. Il est indispensable que la larve ou l'insecte soit en contact avec le végétal traité ou qu'il l'ingère pour qu'il y ait mortalité.

Grâce à sa très faible solubilité dans l'eau et à son affinité vis-à-vis de la cuticule de la plante, **CYPERFOR S** résiste remarquablement au lessivage par les pluies. Ceci lui assure une longue persistance d'action (15 jours minimum).

UTILISATION

L'utilisation de **CYPERFOR S** suivant les bonnes pratiques d'application s'est révélée particulièrement efficace dans la lutte contre les pucerons aussi bien en pépinières ornementales que dans les Espaces verts des villes.

CYPERFOR S est bien adapté pour traiter :

- les cultures et les massifs des rosiers
- les cultures et les massifs d'arbres et arbustes d'ornement
- les cultures et les arbres d'alignement
- les conifères.

Il est recommandé de ne pas traiter à proximité des points d'eau, afin d'éviter tout risque d'entraînement de produit vers les eaux de surface.



EFFICACITÉ

CYPERFOR S est efficace sur un grand nombre d'insectes (tordeuse, cicadelle, carpocapse, doryphore).

En Espaces verts, il est homologué pour lutter contre :

- le puceron du rosier
- les pucerons des arbres et arbustes d'ornement.

CYPERFOR S a un effet répulsif qui engendre l'inhibition de la ponte chez les adultes et de la nutrition chez les larves, ce qui prolonge l'efficacité du traitement.

SÉLECTIVITÉ

CYPERFOR S est sélectif des arbres et arbustes sensibles aux pucerons tels que :

• Arbres feuillus :

– Érable, Marronnier, Châtaignier, Hêtre, Peuplier, Chênes, Bouleau, Saule, Tilleul, Orme, Noisetier, Noyer, Prunus pisardi, Platanes, Pommier d'ornement, Robinier faux acacia, Sorbier des oiseaux, Sureau.


• Conifères :

– Sapins, Chamaecyparis, Cupressocyparis, Cyprès, Junipérus, Mélèze, Épicéa, Pins, Pseudotsuga, Thuyas.

• Arbustes d'ornement :

– Azalées, Bambous, Berberis, Cognassiers du Japon, Cotoneasters, Cytises, Fusains, Fuschias, Genets, Lierres, Houx, Hypericum, Lilas, Troènes, Lonicera, Philadelphus, Pyracanthas, Spirées, Viburnums, Rhododendrons, Groseilliers à fleurs, Lagerstroemia.

• Rosiers.



CYPERFOR S

RECOMMANDATIONS PRATIQUES D'EMPLOI

USAGES ET DOSES

Traitement des parties aériennes :

- Pucerons des arbres et arbustes d'ornement :

50 ml / hl

- Pucerons des rosiers :

500 ml / ha

PÉRIODES D'UTILISATION

CYPERFOR S s'utilise dès l'apparition des premières colonies de pucerons.

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	------	------	-------	-----	------	---------	------	-------	------	------	------

mois de traitement conseillés

COMMENT TRAITER ?

Verser **CYPERFOR S** dans la cuve ou le pulvérisateur partiellement rempli d'eau, puis compléter avec la quantité d'eau nécessaire.

Assurer une agitation régulière de la bouillie pendant le traitement. Utiliser la bouillie immédiatement après sa préparation.

Il est important de veiller à la qualité de la pulvérisation qui doit être bien répartie sur l'ensemble de la végétation. Le volume d'eau à employer devra être augmenté en fonction de la taille des végétaux.

En été éviter de préférence les heures les plus chaudes de la journée.

Traiter par temps calme, sans vent à une température comprise entre 5°C et 25°C à l'ombre.



RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

AMM N° 9900014

Conditionnement : 10 x 1/2 litre

Classement : sans classement.

Nettoyer et rincer soigneusement le pulvérisateur après traitement.

Dangereux pour les organismes aquatiques.

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION DU PRODUIT

* Marque CMPA

(1) Matière active CMPA

 **Dow AgroSciences**

Dow AgroSciences Distribution S.A.S. - B.P. 1220 - 06254 Mougins Cedex
Tel. : 04 93 95 60 00 - Fax : 04 93 95 60 12